



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°02 du 12 Février 1998- 1 page

Grandes Cultures

COLZA : stade C2 Charançons de la tige

Situation

Le vol a débuté le 9 février dans le sud de la Charente, et s'est confirmé le 10 sur l'ensemble de la région.

Les captures devraient se poursuivre les jours à venir. Les femelles vont être rapidement aptes à pondre (environ 10 jours après leur arrivée eu égard aux températures douces).

Préconisation

Prévoyez votre traitement à partir du milieu de la semaine prochaine (à compter du 19 février dès que vous aurez une journée favorable à l'activité des insectes).

Maladies

Situation saine : aucune intervention fongicide n'est actuellement justifiée. (l'intérêt éventuel de prendre en compte l'oïdium, fréquemment observé à l'automne, ne pourra être apprécié qu'en cas de forte installation ultérieure de cette maladie).

CEREALES

BLE : stade tallage

Piétin-verse

Prévision - Situation

Malgré l'absence de nouvelles contaminations depuis la mi-janvier, le

risque climatique reste assez élevé mais légèrement inférieur à celui de 1995.

La récente hausse marquée des températures permettra l'apparition d'autres contaminations secondaires... si elle s'accompagne de séquences pluvieuses.

Le tableau ci-dessous vous aidera à déterminer le risque parcellaire pour 1998 et les parcelles justifiant d'un traitement.

Préconisation

La climatologie des prochaines semaines pourrait conduire à modifier ces premières indications :

- Note supérieure à 13 : Prévoir un traitement anti-piétin ;
- Note de 10 à 13 : Etablir une stratégie de lutte globale (pied/feuilles) ;
- Note inférieure à 10 : Considérer en priorité les maladies foliaires.

Rouille brune

Prévision - Situation

Les températures moyennes nettement supérieures aux Normales (de 2 à 3°C selon les secteurs et les périodes du 01/11/97 au 20/01/98) ont favorisé les contaminations. Par contre, les 3 dernières semaines leur ont été défavorables (températures basses).

Des symptômes ont été régulièrement observés en janvier en Charente-Maritime et Charente notamment sur Soissons et Thésée.

A ce jour, pour des semis d'octobre en variétés sensibles, le niveau de risque est :

- assez élevé en Charente et Charente-Maritime ;
- moyennement élevé dans les autres secteurs.

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13 route de la Forêt
86580 BIAUD
☎ : 05.49.62.98.25
Fax : 05.49.62.98.26

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de POITOU-
CHARENTES

* Directeur-Gérant :
JUILIARD CONDAT

Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 2139 AD
ISSN n° 02294 470

DATE DE SEMIS		TYPE DE SOL		PRECEDENTS	
Avant le 25/10	+ 7	Sol limoneux	+ 5	Blé en 97	+ 3
Du 26/10 au 20/11	+ 3	Groies séchantes	+ 1	Blé en 96	+ 2
				Blé en 95	+ 1
Après le 20/11	+ 1	Sol de marais	0	Blé en 96 et 97	+ 4
		Autres types de sol	+ 3	Blé en 97 et 95	+ 3
NOTE 1		NOTE 2		NOTE 3	

Note globale = Note 1 + Note 2 + Note 3

Note supérieure à 13 = risque élevé

Note de 10 à 13 = risque moyen

Note de 7 à 9 = risque limité

Note inférieure à 7 = risque très faible

COLZA

Arrivée des
charançons
de la tige

D340 To 40830

P59